

# ПАМЯТКА

## Населению по профилактике сибирской язвы

Сибирская язва - одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний животных и человека с очень высокой смертностью. Возбудитель сибирской язвы устойчив в окружающей среде. В почве сохраняется десятилетиями. Кипячение убивает споры сибиреязвенного микроба только через 45-60 минут. Эта болезнь известна с древнейших времен. Ежегодно она уносила сотни тысяч жизней и наносила громадный урон животноводству. Длительность и признаки заболевания многообразны. Заболевание поражает как отдельные органы, так и организм в целом. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды. Основной путь заражения животных - через корма, воду, больное животное. Сибирская язва у животных характеризуется следующими особенностями:

1. Короткий инкубационный период, обычно не превышающий 3-4 дня;
2. Выраженная клиника в виде лихорадочного состояния, упадка сердечно-сосудистой деятельности, кровавого поноса и рвоты. При молниеносной форме у животных наблюдаются судороги, шаткая походка. Животные падают, изо рта, носа, заднего прохода выделяется кровянистая жидкость. Смерть наступает через 30-60 минут. При других формах с более длительным течением понижается аппетит, снижается удой, молоко приобретает горький вкус, слизистую консистенцию, кремовый или кровянистый оттенок. У стельных животных могут быть аборт. На коже могут появляться холодные и безболезненные отеки. Центр отека постепенно омертвевает и на этом месте появляются язвы. У свиней сибирская язва протекает в виде ангины и сопровождается опуханием шеи. У павших животных кровь дегтярного цвета, не сворачивается. Очень часто она истекает из носа, заднего прохода. Трупное окончание отсутствует или оно слабо выражено.

**ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖАЕТСЯ** от больных животных при уходе за ними, при употреблении в пищу мяса, молока от больных животных, разделки туш, при использовании меховой одежды, инфицированной спорами возбудителя. В зависимости от формы течения болезни у людей может наблюдаться лихорадка, кровавый понос и рвота, боли в животе, заболевание органов дыхания, сердечная слабость, отеки и кожные язвы. Болезнь без лечения чаще всего заканчивается смертью.

**ПРОФИЛАКТИКА СОСТОИТ ИЗ:**

- своевременного выявления больных животных, учете и обеззараживании мест захоронения сибиреязвенных трупов,

- вакцинация всего восприимчивого поголовья с профилактической целью,

- недопущения вывоза, ввоза животных, а также животноводческой продукции, убоя животных без согласования с государственной ветеринарной службой и при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

- незамедлительное оповещение ветеринарных специалистов о случаях заболевания и падеже животных.

- для обеспечения безопасности Вашего здоровья, использование в пищу животноводческой продукции и ее переработка разрешается только после ветеринарно-санитарной экспертизы.

**ГРАЖДАНЕ!** Приобретая животноводческую продукцию в местах несанкционированной торговли Вы подвергаете себя и своих близких опасности в заражении особо опасными болезнями общими для человека и животных.