

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ХАРАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ»  
ИНН 3010008646 ОГРН 1043000560723

Нечаева ул., д.26, г.Харабали, Астраханская область, 416010  
Тел. (85148) 5-93-03, факс: (85148) 5-88-99  
E-mail: harab\_gosvet@mail.ru

от 22.09.2023 № 518  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главам МО  
сельских поселений  
Харабалинского района

Уважаемые главы!

ГБУ АО «Харабалинская райветстанция» доводит до Вашего сведения, что на территории Харабалинского района (13,4 км на запад от г.Харабали, между ериком Калмыцкий и р.Ахтуба в границах МО «г.Харабали») зарегистрировано заразное заболевание крупного рогатого скота – **бруцеллез**.

Данный диагноз подтвержден ГБУ АО «Харабалинская райветлаборатория» результатами исследований по экспертизе № В092023-952 от 21.09.2023г.

Просим Вас, для повышения осведомленности населения, разместить на официальных ресурсах администраций и досках для объявлений памятку по профилактике бруцеллеза с/х животных.

Приложение: памятка по бруцеллезу с/х животных.

И.о. начальника учреждения



Е.А. Трещева

## ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

**Бруцеллёз сельскохозяйственных животных** - инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем и особенно часто опорно-двигательного аппарата.

Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи. Пути заражения человека бруцеллезом разнообразны. Заражение происходит контактным путём (с больным животным или сырьем и продуктами животного происхождения), алиментарным путём - (при употреблении мяса и молочных продуктов, полученных от больных бруцеллезом животных и не прошедших достаточную термическую обработку).

Наиболее тяжёлое клиническое течение заболевания наблюдается у людей, заразившихся от мелкого рогатого скота (козы, овцы).

Возбудитель бруцеллёза обладает большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том числе, хранящихся в холодильниках и морозильных камерах. Устойчив длительное время в условиях засолки (до 130 дней).

Наибольшее количество людей заболевает весной и летом, что связано с заражением в сезон окота овец.

Инкубационный период заболевания (время от контакта с больным животным до появления клинических симптомов) составляет 1-2 недели, а иногда затягивается до двух месяцев.

Начинается, как правило, с повышения температуры тела до 39-40°C (характерны подъемы температуры в вечерние и ночные часы) в течение 7-10 дней и более, в отдельных случаях при отсутствии соответствующей терапии температура держится до двух-трех месяцев. Лихорадка сопровождается ознобами, повышенной потливостью и общими симптомами интоксикации. В последующем присоединяются симптомы поражения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма.

Для предупреждения заболевания бруцеллёзом необходимо:

Лицам, содержащим скот в частных подворьях и животноводческим предприятиям всех форм собственности:

- производить регистрацию и нумерацию животных в ветеринарном учреждении.

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования при перевозках, содержании, кормлении животных. Покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой продукции проводить только с ведома и разрешения государственной ветеринарной службы; покупку, перевозку и продажу животных осуществлять при обязательном наличии ветеринарных сопроводительных документов;

- убой животных производить только на специализированных бойнях, не допускать подворного убоя;

- карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных животных для проведения ветеринарных исследований и обработок;

- информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа или об одновременных массовых заболеваниях животных;

- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота.

Населению:

- Приобретать продукты в строго установленных местах (рынки, магазины, мипи -маркеты и т.д.);

- не допускать употребление сырого молока, приобретенного у частных лиц;

- при приобретении мяса требовать документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы;

Соблюдение указанных рекомендаций позволит предотвратить заражение бруцеллёзом.